



علت ایجاد آن چیست؟

اگر فتق، زمینه مادرزادی داشته باشد، ممکن است

در زمان کودکی یا نوجوانی بروز کند. گاهی به دلیل ضعیف شدن عضلات جدار شکم یا افزایش فشار داخل شکم (ناشی از کارستنگین و سرفه های شدید، یا انسداد مسیر ادرار و یبوست مزمن) در سنین بالاتر بروز می کند.

فتق یعنی بیرون زدگی بخشی از احتشاء داخل شکم از جدار شکم. فتق ممکن است در هر قسمتی از جدار شکم ایجاد شود ولی بیشتر در ناحیه کشاله ران پدید می آید. فتق ممکن است از دوران جنینی وجود داشته باشد.

علائم آن چیست؟

- فتق مغبنی یا اینگوینال، معمولاً به صورت یک برآمدگی در ناحیه پائین کشاله ران ایجاد می شود. این برآمدگی در حالت ایستاده بیشتر دیده می شود و با سرفه، زور زدن، و برداشتن وزنه سنگین، بزرگ تر می شود.

- معمولاً درد خفیف و مبهمی در ناحیه کشاله ران وجود دارد که درحال ایستاده و هنگام اجابت مزاج یا برداشتن اجسام سنگین بیشتر می شود.



چه کسانی بیشتر دچار فتق می شوند؟

فتق مغبنی یا اینگوینال در هر فردی و در هر سنی ممکن است ایجاد شود، ولی بعضی از عوامل احتمال بروز فتق را بیشتر می کنند:

- سرفه مزمن و طولانی مدت مثلاً در افراد سیگاری

درمان

- در صورت مشاهده توده ای در قسمت پائین کشاله ران به پزشک متخصص مراجعه کنید.

- فشار زیاد در موقع اجابت مزاج یا ادرار

- برداشتن اجسام سنگین

تا زمانی که به شما اجازه داده نشده، ناشتا
بمانید.

با دستور پزشک معمولاً ۸ ساعت بعد از
عمل نباید از تخت پائین بیاید.

در صورت وجود درد، تهوع، استفراغ یا هر
علامت غیر عادی دیگر، به پرستار اطلاع
دهید.

پس از ترخیص، تا ۶ هفته از انجام کارهای
سنگین خودداری کنید.

معمولًا ۱ تا ۳ ماه بعد از عمل، انجام
فعالیتهای ورزشی بلامانع است.

معمولًا ۲۴ ساعت بعد از عمل پانسمان را بر
می دارند و نیازی به پانسمان مجدد نیست، و
می توانید استحمام کنید. ۷ روز بعد از عمل نیز
با نظر پزشک، بخیه ها را برمی دارند.

در مورد نیاز به دارو یا استراحت بعد از عمل
از پزشک سؤال کنید.

- در صورت عدم درمان به موقع، پیشرفت فتق
ممکن است منجر به انسداد روده شود که در این
صورت بایستی عمل جراحی اورژانسی انجام شود.
- استفاده از فتق بند اگر چه در مراحل ابتدایی مؤثر
است، ولی به هیچ وجه توصیه نمی شود زیرا
احتمال عوارض بعد از عمل را بیشتر می کند.

*آمادگی قبل از عمل

- قبل از عمل با مراجعه به جراح و تعیین تاریخ
عمل بستری می شوید.
- پزشک بیهوشی شما را معاینه می کند.
- قبل از عمل موهای ناحیه عمل از نوک
سینه ها تا پائین کشاله ران را کاملاً بزنید.
بهتر است این کار را با تبعیغ انجام ندهید.
- شب قبل از عمل استحمام کنید.
- حداقل ۶ ساعت قبل از عمل ناشتا بمانید.
- سابقه بیماریهای قلبی، عروقی و داروهای
صرفی خود را به پزشک اطلاع دهید.

*مراقبت های بعد از عمل